

	癌種	コード	レジメン名称	1コース	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤
膵	膵癌	070000	GEM(3投1休)	4週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8・15				
膵	膵癌	070005	GEM(2投1休)	3週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8				
膵	膵癌	070010	GEM+S-1	3週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1タから開始した場合はday15朝まで服用		
膵	膵癌	070020	GEM+タルセバ	4週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8・15	タルセバ 100mg/body 連日			
膵	膵癌	070050	アブラキサン+GEM	4週	nabPTX(アルブミン懸濁型PTX) 125mg/㎡ day1・8・15	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8・15			
膵	膵癌	070060	FOLFIRINOX	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	CPT-11(イリノテカン) 180mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/㎡ day1-2(46時間)
膵	膵癌	070070	mFFX(modified FOLFIRINOX)	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/㎡ day1-2(46時間)	
膵	膵癌	070090	オニバイド+5-FU/VL	2週	オニバイド(リボソーマル・イリノテカン) 70mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/㎡ day1-2(46時間)		
胆	胆道癌	080000	GEM(3投1休)	4週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8・15				
胆	胆道癌	080005	GEM(2投1休)	3週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8				
胆	胆道癌	080010	GEM+S-1	3週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1タから開始した場合はday15朝まで服用		
胆	胆道癌	080030	GC(GEM+CDDP)	3週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1・8	CDDP(シスプラチン) 25mg/㎡ day1・8			
胆	胆道癌	080040	GCS(GEM+CDDP+S-1)	2週	GEM(ゲムシタビン) 1000mg/㎡ day1	CDDP(シスプラチン) 25mg/㎡ day1	S-1 80-120mg/日 day1-7		
胆	胆嚢癌	086000	CDDP+VP-16	3週	CDDP(シスプラチン) 80mg/㎡ day1	VP-16(エトポシド) 100mg/㎡ day1-3			